

84

**UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE  
„CAROL DAVILA”  
BUCUREȘTI**



26.05.2006

**Str. Calea Plevnei 19  
București 01022**

**Tel: (4021) 315 86 49  
(4021) 314 25 09  
Fax: (4021) 312 67 65**

**FACULTATEA  
DE  
MEDICINĂ DENTARĂ**

București, 7.04.2006

Către,

**Serviciul de Medicină Legală Argeș**

Ca urmare a adresei Dvs. Nr.738/A11/2005 din 11.10.2005 adresată Decanatului Facultății de Medicină Dentară (Stomatologie) București, am dispus formarea unei comisii care să analizeze și să vă răspundă în legătură cu solicitările Dvs. cu privire la cazul pacientului Gherman Paul Adrian, în vîrstă de 11 ani, domiciliat în Pitești.

Concluziile comisiei formate din: Prof.Dr.Rodica Luca, Prof.Dr.Dragoș Stanciu și Prof.Dr.Alexandru Bucur sunt următoarele:

1. În stabilirea diagnosticului de către Dr.Negru Emilian a lipsit un element esențial reprezentat de teleradiografia de profil, care ar fi pus în evidență retrognăția gravă superioară și decalajul negativ între bazele maxilare, atât relativ cât și absolut. În aceste condiții, diagnosticul pus de dl.doctor numai pe baza examenului clinic, a modelelor de studiu și a ortopantomogramei a condus la un diagnostic incomplet și în consecință incorect.

2. În stabilirea conduitei terapeutice, cu toate că pentru erupția caninilor superiori există un deficit mare de spațiu, în condițiile în care pe arcadă nu s-a produs înlocuirea molarilor secunzi temporari cu premolarii secunzi, trebuia apreciat câștigul de spațiu ce s-ar fi obținut în urma acestei permutări (distanța 2-6 fiind de 17-18 mm, normal 21 mm).

Pe de altă parte, procesul alveolar crește pe măsura erupției dinților definitivi, ori îndată cu erupția caninilor se poate sconta fără tratament ortodontic, la un plus de spațiu de 2-3 mm. Extracția premolarilor, efectuată de dl.doctor a înlăturat doi centri de creștere.

3. Diastema cu axele coroanelor celor 2 incisivi centrali superiori divergentă este expresia unei lipse de spațiu pe care dl.ddoctor a considerat-o ca un exces de spațiu (diagnostic incorrect). Închiderea acestui spațiu a produs blocarea creșterii pe linia mediană iar mijlocul terapeutic utilizat a condus la pierderea dinților.

Acest tip de terapie este total contraindicat în această situație.

4. În concluzie, pierderea dinților s-a produs datorită unui diagnostic incorrect și în consecință a unui tratament ortodontic total neadecvat (premolarii s-au pierdut prin îndepărțarea chirurgicală, în condițiile în care trebuiau păstrați, iar incisivii centrali, prin utilizarea unui mijloc terapeutic contraindicat).

Ca urmare, situația clinică rezultată impune o supraveghere ortodontică de durată iar rezolvarea finală este posibil să includă o etapă chirurgicală, după încheierea perioadei de creștere (aproximativ la vîrstă de 17-18 ani).

**Prof.Dr.Rodica Luca**

PROF. DR. RODICA LUCA  
MEDIC PRIMAR STOMATOLOG  
COD 846601

**Prof.Dr.Dragoș Stanciu**

Dr. STANCIU  
Doctor în științe medicale  
Cod 705406

**Prof.Dr.Alexandru Bucur**

Prof. DR. BUCUR ALEXANDRU  
SEF CLINIC  
CHIRURGIE MAXILOFACIALĂ  
DOCTOR IN STIINȚE MEDICALE  
COD 220825